
EL APOYO SOCIAL FUNCIONAL PERCIBIDO DURANTE LA CUARENTENA OBLIGATORIA POR COVID-19, Y SU ASOCIACIÓN CON LAS SOMATIZACIONES.

Caccia, P.A.^{1,2}; De Grandis, M:C.^{1,2,3}; Pérez, G.A.²

1. Instituto de Investigaciones. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Laboratorio de Cognición y Políticas Públicas.
2. Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Psicología y Relaciones Humanas.
3. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Contacto: caccia.pau@gmail.com

Palabras Clave: Apoyo Social Funcional – Somatizaciones – Ideación Paranoide - Ansiedad Fóbica - Covid19

Resumen

El objetivo del presente estudio fue describir y evaluar si existe relación significativa entre el Apoyo Social Funcional percibido y las Somatizaciones, específicamente en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por Covid-19, en Buenos Aires, Argentina, indagando a su vez la Ansiedad Fóbica y la Ideación Paranoide. Se trató de un diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo y correlacional. Para la medición de las variables se utilizó el Inventario de Síntomas SCL-90-R y la Escala de Apoyo Social Funcional Duke-Unk-11. A su vez, se indagaron factores laborales, modalidad de trabajo, efectos económicos, exposición a noticias sobre el tema, búsqueda de información, cantidad de llamados al 107, veces que creyó tener Covid-19, y percibimiento de ayuda gubernamental. La muestra estuvo conformada por 497 sujetos (Género femenino=329, Masculino=165, Otro=3) de entre 18 y 80 años (\bar{x} =39.9), residentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En la misma predominan los niveles de estudios Universitarios Completos (34.4%) e Incompletos (25.8%). El 71,6% de los encuestados trabajaron durante la cuarentena, el 67% lo hizo bajo la modalidad Home office, el 27.5% fuera de su casa y el 5.4% trabajó de las dos formas. De todos ellos, el 43.3% vio afectado negativamente su ingreso económico. En cuanto a las variables psicológicas, se halló que tanto el nivel de Somatizaciones (\bar{x} =20.03, Ds =8.14) como el de Ansiedad Fóbica (\bar{x} =9.99, Ds =4.72) son más altos que los de la muestra normativa. En cambio, el nivel de Ideación Paranoide (\bar{x} =9.12, Ds =3.89) fue menor en comparación con los baremos de la muestra mencionada. Los resultados confirmaron una relación

